

HLOUBKOVĚ ÚČINNÝ ARBORICID A HERBICID

- Vynikající účinnost na náletové listnaté dřeviny na loukách a pastvinách.
- Specialista na maliník, ostružiník a náletové dřeviny v lesním hospodářství.
- Výborný účinek na bolševník, křídlatku sachalinskou a japonskou, kopřivy a další odolné druhy.
- Nepoškozuje traviny.
- V půdě nezanechává škodlivá rezidua.



Garlon New - účel použití

GARLON® NEW je systemický arboricid a herbicid určený k hubení nežádoucích dřevin a širokolisté buřeny v lesním hospodářství, k hubení náletových dřevin na loukách a pastvinách, pod sloupky vysokého napětí a podél železničních tratí a silnic a k hubení nežádoucí vegetace na lesní a nezemědělské půdě.

Garlon New - registrované použití

Louky a pastviny, trávníky, orná půda po sklizni, nezemědělská půda. Potlačení pařezové výmladnosti.

Garlon New - spektrum účinnosti

Garlon New je zvláště účinný na akát, břízu, olši, bez černý, šípek a další listnaté dřeviny, na maliník, ostružiník, bolševník velkolepý, rdesno sachalinské (křídlatku), kopřivy,

přesličky, bršlici kozí nohu, hasivku orličí a široké spektrum dvouděložných bylin. Garlon New nepoškozuje traviny. Odolné jsou brusnice brusinka a brusnice borůvka. Slabý účinek má Garlon New na bodlák, lopuch, pcháč oset a turan kanadský (zde se doporučuje TM s přípravkem Lontrel 300).

Návod na použití, dávkování:

Plodina	Plevele	Dávka v %	OL	Poznámka
Louky, pastviny	svízel, šťovík, pampeliška, kopřiva, bolševník, ostružiník aj.	2 - 3 % koncentrace pro lokální (bodovou) aplikaci Max. dávka je 8 l/ha.	14 dní	Lokální aplikace
Zemědělská půda dočasně neobdělávaná	plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny	Max. dávka je 8 l/ha.		Postřik plošný
Trávníky	svízel, šťovík, pampeliška, kopřiva, bolševník, ostružiník aj.	2 - 3 % koncentrace pro lokální (bodovou) aplikaci Max. dávka je 8 l/ha.	14	
Orná půda po sklizni (2 - 3 měsíce před výsevem plodiny)	kopřiva, šťovíky, ostružiník, a další citlivé plevle	2 - 3 % koncentrace pro lokální (bodovou) aplikaci Max. dávka je 8 l/ha.		Lokální aplikace
Vánoční stromky (smrky a jedle)	ostružiník, kopřiva, šťovíky, a další citlivé plevle	2 - 3 % koncentrace pro lokální (bodovou) aplikaci Max. dávka je 8 l/ha.		
Potlačení pařezové výmladnosti		30 % roztok		Nátěr

Garlon New obsahuje 20 g fluoroxypyru a 60 triclopyru v 1 litru přípravku. Při aplikaci Garlonu New se vždy řiďte platnou etiketou.

Garlon New - základní informace

Garlon New je širokospektrální systemický arboricid a herbicid. Po postřiku je snadno přijímán listy a lodyhami, méně kořeny. Účinná látka je v rostlinách rychle translokována do vegetačních vrcholů a vyvolává typické auxinové příznaky, které vrcholí zhnědnutím listů a odumřením celé rostliny. Nejlepších výsledků se dosahuje při aplikaci na list v době aktivního růstu plevelů. Déšť za 1 hodinu po aplikaci nesnižuje účinnost přípravku.

Garlon New - termín aplikace

Na loukách a pastvinách se Garlon New aplikuje v době plného olistění nežádoucích dřevin nebo v první polovině vegetace nežádoucích plevelů. Aplikace je možná i po jednotlivých sečích, vždy když se

nežádoucí plevle opět plně olistí. Ostružiník je možno hubit celoročně, na jaře ihned, jakmile obnoví růst, na podzim do konce října, aby byla účinná látka rozvedena ještě před ukončením vegetace. Při použití postřikem na list jsou nejlepší výsledky dosahovány v období aktivního růstu buřeny a plevelů. Použití Garlonu New



Garlon New v koncentraci 2 - 5 % spolehlivě působí proti odolným dvouděložným plevelům jako je např. bolševník a křídlatka.

proti pařezové výmladnosti se nedoporučuje časně na jaře, kdy mizí tok vyplaví přípravek z řezné plochy a aplikace je neúčinná nebo má sníženou účinnost. Při hubení nežádoucí vegetace, zejména dřevin, na železničním tělese, je vhodné ošetřovat po deštích, kdy je z rostlin splaven prach z železnice. Garlon New hubí spolehlivě přesličku v koncentraci 6 % nebo v dávce 6 l/ha.

Garlon New - mísitelnost

Pro zesílení účinku Garlonu New na plevle a buřeny z čeledi hvězdnicovitých (pcháče, bodláky, lopuchy, turan kanadský) je vhodná směs s Lontrelem 300 v dávce 0,5 l/ha. TM Garlonu New 3,0 - 5,0 l/ha a 3 l/ha glyfosátu hubí spolehlivě veškerou buřen včetně travovitých plevelů.